

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616  
Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής – Α. Παπαδάκη / Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ν. Μπαγκής, Α. Παπαδάκη, Δίκτυο Οινοποιών

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Νο17

- Ευδεμίδα:** Η 3<sup>η</sup> πτήση παραμένει σε εξέλιξη κυρίως στις μεσοπρώιμες και όψιμες ζώνες.  
**Ωίδιο:** Τα σταφύλια παραμένουν ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα.  
**Τζιτζικάκια:** Αυξημένοι κατά θέσεις οι πληθυσμοί → να γίνεται αντιμετώπιση μετά από έλεγχο.  
**Σύσταση:** Οι ψεκασμοί την περίοδο αυτή να εφαρμόζονται αυστηρά από το σούρουπο και μετά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

**Προσοχή :** Σε αμπέλια που είναι κοντά στη συγκομιδή να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής. Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες να προηγείται απαραίτητα η εκτίμηση του βαθμού ωρίμασης και η συνεννόηση με το οινοποιείο που θα παραδοθούν τα σταφύλια.

### Φαινολογικά στάδια

- Στον Πιν.1 δίνεται η εξέλιξη των βλαστικών σταδίων στην ποικιλία σουλτανίνα σε τρεις ζώνες αναφοράς.
- Γενικά, η χρονιά σε σχέση με το 2024 παραμένει πιο όψιμη κατά μια εβδομάδα περίπου.

### Πίνακας 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στην ΠΕ Ηρακλείου

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Στάδιο Μ αρχή γυάλισματος - γυάλισμα		Στάδιο Ν έναρξη ωρίμασης - πλήρης ωρίμαση	
	Κλίμακα Baggiolini	81		85
Κλίμακα BBCH	81		85	
<b>Πρώιμη ζώνη</b>			<b>ολοκληρώνεται η ωρίμαση</b>	
<b>Μεσοπρώιμη</b>		<b>τα σταφύλια ωριμάζουν</b>		
<b>Όψιμη ζώνη</b>	<b>γυάλισμα σταφυλιών</b>			

**ΕΥΔΕΜΙΔΑ:** (*Lobesia botrana*)

**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**



- Η 3<sup>η</sup> πτήση του εντόμου :

- στις πρώιμες περιοχές παρουσιάζει σημαντική μείωση,
- στη μεσοπρώιμη ζώνη είναι σε εξέλιξη και οι πληθυσμοί παραμένουν αυξημένοι,
- στην όψιμη ζώνη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

- Οι χρόνοι έναρξης των πτήσεων του εντόμου και η γενική τάση της δραστηριότητας την περίοδο αυτή με βάση τις συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης δίνονται κατά αμπελουργική ζώνη του νησιού στους Πιν. 2, 3.

**Πιν.2. Εξέλιξη της δραστηριότητας του εντόμου σε περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου**

Ζώνη →	Πρώιμη	Ενδιάμεση	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Έναρξη 2 <sup>ης</sup> πτήσης→	15 - 16 Μαΐου	18 - 19 Μαΐου	21 - 23 Μαΐου	28 - 30 Μαΐου
Έναρξη 3 <sup>ης</sup> πτήσης→	2 - 3 Ιουλίου	5 - 7 Ιουλίου	11 - 13 Ιουλίου	14 - 17 Ιουλίου
Δραστηριότητα περιόδου (συλλήψεις)	χαμηλή	μέτρια	μέτρια έως αυξημένη	μέτρια έως αυξημένη

**Πιν.3. Εξέλιξη της δραστηριότητας του εντόμου σε περιοχές των ν. Χανίων - Ρεθύμνου**

Ζώνη →	Πρώιμη	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Έναρξη 2 <sup>ης</sup> πτήσης→	18 - 19 Μαΐου	24 - 25 Μαΐου	1 - 3 Ιουνίου
Έναρξη 3 <sup>ης</sup> πτήσης→	4 - 6 Ιουλίου	13 - 15 Ιουλίου	17 - 18 Ιουλίου
Δραστηριότητα περιόδου (συλλήψεις)	σε μείωση	μέτρια έως αυξημένη	μέτρια έως αυξημένη

### **Οδηγίες:**

Για τελικό ποιοτικό προϊόν η ανοχή προσβολής των σταφυλιών πρέπει να είναι πολύ μικρή έως μηδενική. Συνιστάται αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

➤ **Νομοί Ηρακλείου - Λασιθίου:**

Ζώνη →	Πρώιμη	Ενδιάμεση	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Έναρξη ψεκασμών→	8 - 10 Ιουλίου	12 - 13 Ιουλίου	16 - 19 Ιουλίου	21 - 23 Ιουλίου
Επανάληψη ψεκασμού *→	17 - 19 Ιουλίου	21 - 23 Ιουλίου	25 - 27 Ιουλίου	<b>30 - 31 Ιουλίου</b>
Επανάληψη ψεκασμού *→	26 - 28 Ιουλίου	<b>30 - 31 Ιουλίου</b>		

➤ **Νομοί Χανίων - Ρεθύμνου :**

Ζώνη →	Πρώιμη	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Έναρξη ψεκασμών→	11 - 12 Ιουλίου	18 - 20 Ιουλίου	23 - 25 Ιουλίου
Επανάληψη ψεκασμού *→	20 - 22 Ιουλίου	27 - 29 Ιουλίου	<b>1-2 Αυγούστου</b>

- Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια → θα πρέπει να καλύπτονται καλά κατά την εφαρμογή.
- Οι εφαρμογές να γίνονται από το σούρουπο και μετά.

Στους παραπάνω πίνακες δίνονται συνολικά οι προτεινόμενοι ψεκασμοί ανά ζώνη (με έντονη γραφή αφορούν την τρέχουσα περίοδο και με πλάγια είναι οι προτεινόμενοι σε προηγούμενα δελτία).

\* Οι ημερομηνίες επανάληψης ψεκασμού είναι ενδεικτικές. Σε κάθε περίπτωση σας συμβουλευόμαστε, σε συνεργασία με τον γεωπόνο σας, να λαμβάνετε υπόψη την διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήσατε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

**ΩΙΔΙΟ:**

(*Erysiphe necator*)  
(χολέρα, σίρικας)

**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι την έναρξη του γυαλισματος, οι μίσχοι - άξονες των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή και το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο.

**Οδηγίες:**

➤ Συνιστάται να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα στα αμπέλια με συμπτώματα :

1. Στα επιτραπέζια σταφύλια που δεν συγκομίζονται σύντομα.
2. Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες μέχρι την έναρξη του γυαλισματος.

➤ Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει στα αμπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας (άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και σε αυτά που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (αυξημένη υγρασία, καλή σκίαση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

**ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ:**

(Διάφορα είδη)



Πτερωτό

Άπτερο

**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Πολύ αυξημένοι κατά τόπους οι πληθυσμοί (ενήλικα πτερωτά και άπτερα στην κάτω πλευρά του φύλλου) κυρίως σε αμπέλια που διατηρούν τρυφερή βλάστηση.

**Οδηγίες:**

1. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.

Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του.

Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

2. Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα. Οι ψεκασμοί για τα τζιτζικάκια στοχεύουν στη βλάστηση.

Σύσταση : μην κάνετε αντιμετώπιση χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

**Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :**

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα (ΦΠΠ) για την καλλιέργεια, για τον εχθρό ή την ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής.
- Εγκεκριμένα ΦΠΠ ανά καλλιέργεια και εχθρό / ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)
- ✓ **Να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή.**
- ✓ **Να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας κοντά στη συγκομιδή.**

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον.


Τα «χημικά» φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα.

Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



Ηράκλειο 28 Ιουλίου 2025  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
α/α  
Βλαχάκης Μαρίνος

<a href="#">Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου</a>	 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων <b>αμπελιού</b> αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή <a href="#">πατώντας εδώ</a>	
<a href="#">Εφαρμογή I-Agric του ΥΠΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο</a>	